



MAPEL WOOD FEVER BOMBINO  
Dam

SEAGULL-BAY HEADLINER  
MAPEL WOOD FEVER BOMBINO VG-88-2YR-USA  
CRACKHOLM FEVER  
GEN-I-BEQ SHOTTLE BOMBI VG-89-6YR-CAN 28\*  
PICSTON SHOTTLE  
GEN-I-BEQ CHAMPION BAMBI EX-90-6YR-CAN 4\*

| GTPI 2315                                              |                 |                         |                          |                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| TD TR TL TY TV HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF |                 |                         |                          |                     |
| Num.Reg #: HO840M3009118773                            |                 | aAa: 234165             |                          | DMS: 126            |
| Nacimiento: 01/27/2013                                 |                 | Kappa Caseina: AA       |                          | Beta Caseina: A1A2  |
| PRODUCCION                                             | 122 Rebaños     | 134 Hijas               | 91% Rep.                 | MACE-G / 04-25      |
| Leche lbs<br>-1016                                     | Grasa lbs<br>-7 | Grasa %<br>+0.14        | Proteína lbs<br>-17      | Proteína %<br>+0.06 |
| NM\$ -260                                              | CM\$ -238       | FM\$ -309               | GM\$ -238                | DWP\$               |
| Eficiencia de Conversión<br>-66                        | IR<br>114       | Comida Ahorrada<br>-200 | Eficiencia Metano<br>111 |                     |

| SALUD Y REPRODUCCIÓN    |      | Immunity 98                                   |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Vida Productiva         | -2.0 | Inmunidad crías 92                            |
| Células Somáticas       | 2.85 | Tasa Preñez Vacas 0.5                         |
| Fertilidad de las Hijas | -0.1 | Tasa Preñez Novillas 2.6                      |
| Durabilidad             | -2.8 | Facilidad de Parto 2.5% 80% Rep.              |
| Durabilidad Novillas    | 0.6  | Facilidad de Parto de las Hijas 2.2% 79% Rep. |
| Indice de Fertilidad    | 0.6  | Crías del Toro que Nacen Muertas 7.1%         |
|                         |      | Crías de las Hijas que Nacen Muertas 6.1%     |

| TIPO            | 109 Rebaños | 127 Hijas            | 84% Rep. | MACE / 04-25 |
|-----------------|-------------|----------------------|----------|--------------|
| PTAT            | 0.44        | Estruct. y Capacidad | 0.52     |              |
| Compuesto Ubres | -0.44       | Estruct. Lechera     | 0.55     |              |
| Compuesto Patas | 0.40        |                      |          |              |

|                                |  |               |       |
|--------------------------------|--|---------------|-------|
| Estatura                       |  | Alta          | +1.14 |
| Fortaleza                      |  | Fuerte        | +0.89 |
| Profundidad Corporal           |  | Profunda      | +1.22 |
| Estructura Lechera             |  | Cost. Abierta | +0.73 |
| Ángulo de Grupa                |  | Isq. Altos    | -1.95 |
| Anchura Grupa                  |  | Estrecha      | -0.78 |
| Patas Vista Lateral            |  | Curvas        | +0.26 |
| Patas Vista Posterior          |  | Aplomadas     | +0.80 |
| Ángulo Podal                   |  | Bajo          | 0.00  |
| Colocación de las Patas        |  | Correcta      | +0.61 |
| Inserción Anterior             |  | Débil         | -0.18 |
| Altura Inserción Posterior     |  | Baja          | 0.00  |
| Anchura Inserción Posterior    |  | Estrecha      | -0.02 |
| Ligamento Suspensor            |  | Débil         | -0.02 |
| Profundidad Ubre               |  | Profunda      | -0.09 |
| Colocación Pezones Anteriores  |  | Abiertos      | -0.63 |
| Longitud de Pezones            |  | Largos        | +1.14 |
| Colocación Pezones Posteriores |  | Abiertos      | -0.20 |